

Przygotowanie do USG jamy brzusznej

Prawidłowe przygotowanie do badań diagnostycznych (w tym USG) jest podstawowym czynnikiem gwarantującym wysoką jakość badania, co ułatwia szybkie postawienie diagnozy.

W dniu poprzedzającym badanie:

Obowiązkowo dieta lekkostrawna. Zakaz spożywania produktów wzdymających (fasola, groch, kapusta, surowe owoce, tłuste lub smażone potrawy, świeże pieczywo). Przed snem należy zażyć 1 kapsułkę ULGIX USG lub 2 kapsułki Ulgix Max i popić wodą niegazowaną (1 szklanka).

W dniu badania:

Należy być na czczo (lub 6-7 godzin po małym, lekkostrawnym posiłku). Zażyć 1 kapsułkę ULGIX USG (lub 2 kapsułki Ulgix Max) 5-6 godzin przed badaniem i popić wodą niegazowaną.

Na 2 godziny przed badaniem wypić 1 litr wody niegazowanej i nie oddawać moczu.

W dniu badania nie palimy papierosów i nie żujemy gumy do żucia.

Konieczne należy zabrać z sobą wyniki poprzednich badań obrazowych (USG, KT, NMR)

Przygotowanie do USG jamy brzusznej

Prawidłowe przygotowanie do badań diagnostycznych (w tym USG) jest podstawowym czynnikiem gwarantującym wysoką jakość badania, co ułatwia szybkie postawienie diagnozy.

W dniu poprzedzającym badanie:

Obowiązkowo dieta lekkostrawna. Zakaz spożywania produktów wzdymających (fasola, groch, kapusta, surowe owoce, tłuste lub smażone potrawy, świeże pieczywo). Przed snem należy zażyć 1 kapsułkę ULGIX USG lub 2 kapsułki Ulgix Max i popić wodą niegazowaną (1 szklanka).

W dniu badania:

Należy być na czczo (lub 6-7 godzin po małym, lekkostrawnym posiłku). Zażyć 1 kapsułkę ULGIX USG (lub 2 kapsułki Ulgix Max) 5-6 godzin przed badaniem i popić wodą niegazowaną.

Na 2 godziny przed badaniem wypić 1 litr wody niegazowanej i nie oddawać moczu.

W dniu badania nie palimy papierosów i nie żujemy gumy do żucia.

Konieczne należy zabrać z sobą wyniki poprzednich badań obrazowych (USG, KT, NMR)

Przygotowanie do USG jamy brzusznej

Prawidłowe przygotowanie do badań diagnostycznych (w tym USG) jest podstawowym czynnikiem gwarantującym wysoką jakość badania, co ułatwia szybkie postawienie diagnozy.

W dniu poprzedzającym badanie:

Obowiązkowo dieta lekkostrawna. Zakaz spożywania produktów wzdymających (fasola, groch, kapusta, surowe owoce, tłuste lub smażone potrawy, świeże pieczywo). Przed snem należy zażyć 1 kapsułkę ULGIX USG lub 2 kapsułki Ulgix Max i popić wodą niegazowaną (1 szklanka).

W dniu badania:

Należy być na czczo (lub 6-7 godzin po małym, lekkostrawnym posiłku). Zażyć 1 kapsułkę ULGIX USG (lub 2 kapsułki Ulgix Max) 5-6 godzin przed badaniem i popić wodą niegazowaną.

Na 2 godziny przed badaniem wypić 1 litr wody niegazowanej i nie oddawać moczu.

W dniu badania nie palimy papierosów i nie żujemy gumy do żucia.

Konieczne należy zabrać z sobą wyniki poprzednich badań obrazowych (USG, KT, NMR)